

オプジーコの治療をお受けになる方へ

★治療スケジュール

症状や経過に合わせて治療スケジュールが変わることがあります。

お薬の名前	1日目	2~14日目
オプジーコ (ニボルマブ)	 30分	お休み

★起こりやすい副作用 これらの副作用が、すべての方に起こるわけではありません。

〈血液検査からわかる副作用〉

甲状腺機能低下

甲状腺の働きが低下することがあります。甲状腺の働きが低下すると、元気が出ない、疲れやすい、声がかすれる、肌の乾燥といった症状が現れることがあります。そのため、定期的に血液検査を行い、甲状腺の働きを確認します。

肝機能障害

肝臓の働きが低下することがあります。そのため、定期的に血液検査を行い、肝臓の働きを確認します。

〈ご自身でわかる副作用〉

間質性肺炎

「階段を登ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる」、「空咳が出る」、「発熱する」このような症状が急に現れる、または以前から症状があった場合は、症状が急に悪くなることがあれば病院へ連絡して下さい。

大腸炎・下痢

下痢(軟便)もしくは通常よりも頻回の排便、血便もしくは黒くタール状で粘着質の便、重度の腹部痛もしくは圧痛が見られた場合は、病院への連絡が必要です。

糖尿病

「激しい口渴」、「多尿」、「尋常ではない倦怠感」、「恶心・嘔吐・腹痛」が見られた場合は、病院への連絡が必要です。

※ここに記載した副作用以外にも、体の異常を感じたら病院にご連絡ください。

●緊急連絡先●

横須賀共済病院（代表）：046-822-2710

月～金曜日の8：30～17：15は「治療を受けた診療科」
それ以外の曜日、時間帯は「急诊室」にご連絡ください。