

## はしか（麻疹）の感染が報告されています

現在、海外ではしか（麻疹）が流行しており、  
日本でも感染が報告されています

※2015年3月27日世界保健機関西太平洋地域事務局により、  
日本は麻疹の排除状態にあることが認定されている

### ●はしか（麻疹）

- 麻疹ウイルスによって引き起こされる  
急性の全身感染症

#### ➤ うつり方

**空気感染**…空気中に漂うウイルス  
を吸い込む

**飛沫感染**…飛沫を吸い込む



#### ➤ 特徴

##### ●感染力が強い

免疫のない人がかかると100%発症する  
1人から約12-18人に感染する

（基本再生産数 12-18）【参考：インフルエンザ 1-2】

- 一度感染して発症すると一生免疫が持続する



#### ➤ 症状

- 初期

38℃前後の発熱（2～4日間続く）  
咳・鼻水などの上気道症状  
眼の充血・目やになどの結膜炎症状  
**口腔内の白色の斑点（コプリック斑）**

- 発疹期

**39℃以上の高熱**  
（発疹出現後3-4日続く）  
顔から体幹、手足に広がる**発疹**



- 回復期

熱がさがり、発疹の色が薄くなる  
発疹の色はしばらく残る（色素沈着）

#### ➤ 予防：麻疹ウイルスに対する

**免疫（抗体）を持つ**

**ワクチン接種（2回）**



#### ➤ はしか（麻疹）かな？と思ったら

**受診**…**事前に医療機関に電話連絡し、**  
症状を伝える

※公共交通機関の利用を避ける

横須賀市ホームページ

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3170/kansennsyou/masin202403.html>

季節の変わり目で体調崩しやすいためご注意ください

（感染制御部/ICT）